

مطالعه ویژگی‌های آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دختران نوجوان والیبالیست ایران

فاطمه امیدعلی^{۱*}، عباس صارمی^۲، نادر شوندی^۲، محمد رضا معظمی گودرزی^۳

۱- مری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)، بروجرد، ایران

۲- دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه اراک، اراک، ایران

۳- استادیار ریاضی کاربردی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

* نشانی نویسنده مسئول: بروجرد- کیلومتر ۳ جاده خرم‌آباد- دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)

Email: F.omidali@abru.ac.ir

وصول: ۹۴/۰۸/۰۱ اصلاح: ۹۴/۰۹/۱۴ پذیرش: ۹۴/۱۱/۲۷

چکیده

مقدمه و هدف: آمادگی جسمانی، شکل و ساختمان بدن، نقش مهمی در موفقیت ورزشکاران دارد. داشتن ویژگی‌های بدنی و فیزیولوژیک در هر رشته ورزشی مهم و عامل تعیین‌کننده‌ای در عملکرد ورزشکاران می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگی‌های آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دختران نوجوان والیبالیست ایران و ارائه الگو با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) انجام شد.

روش‌شناسی: ۱۷۲ دختر والیبالیست منتخب استان‌های کشور با دامنه سنی $15/33 \pm 1/5$ سال در مطالعه شرکت کردند. سنجش فاکتورهای ترکیب بدنی شامل وزن، شاخص توده بدنی، درصد چربی، نسبت دور کمر به باسن، توده بدون چربی و شاخص‌های آنتروپومتریکی شامل قد، طول دست و طول پا بود. متغیرهای فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی توسط توان پایین‌تنه، چابکی، انعطاف‌پذیری، دامنه حرکتی مفصل شانه، قدرت دست، درازوپنثیت و توان هوایی اندازه گیری شدند. ضریب همبستگی پیرسون، آمار توصیفی و روش ریاضی (DEA) برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند ($P \leq 0.05$).

یافته‌ها: نتایج نشان داد، ارتباط معناداری میان پوشش با طول پا، درصد چربی با شاخص توده بدنی و انعطاف‌پذیری با درصد چربی وجود دارد. قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه شرکت کنندگان در مقایسه با برخی مطالعات انجام شده بیشتر و توان هوایی، درازوپنثیت، توان پایین‌تنه، قد، وزن و درصد چربی کمتر بود. با توجه به نتایج تحلیل پوششی داده‌ها، ۸۴ درصد از افراد شرکت کننده کارا تشخیص داده شدند.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه می‌تواند الگویی مناسب برای استعدادیابی و انتخاب بازیکنان والیبال باشد.

واژه‌های کلیدی: والیبال، ترکیب بدنی، ویژگی‌های آنتروپومتری، تحلیل پوششی داده‌ها.

مقدمه

نداشتن فیزیک مناسب بر عملکرد ورزشکار تأثیرگذار است. به نظر وی تفاوت بین ورزشکاران در عوامل مورفولوژیکی است.(۲). از این‌رو شناخت این خصوصیت‌ها به ویژه در ورزشکاران نخبه، به مریبان و متخصصان علوم ورزش کمک می‌کند تا در راستای استعدادیابی علمی، افراد مناسب را شناسایی کرده و برنامه‌های تمرینی لازم برای رسیدن به موفقیت‌های ورزشی را به صورت بهینه طراحی کنند. ورزشکاران نیز با کسب آگاهی بهتر نسبت به ویژگی‌های موردنیاز رشته ورزشی خود می‌توانند با انگیزه و تلاش بیشتری به

اجرای بهینه و مطلوب مهارت‌های ورزشی ناشی از تعامل پیچیده عوامل فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، روان‌شناختی و زیست‌حرکتی با یکدیگر است. لازمه و پیش‌شرط دست‌یابی به موفقیت‌های ورزشی برخورداری از قابلیت‌های جسمانی، از قبیل ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی معین است(۱). بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهند که در هر رشته ورزشی، ورزشکاران نخبه خصوصیات فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی ویژه‌ای دارند. توریولا(۱۹۸۷) در تحقیق خود نشان داد که

مطالعات کمی در مورد نیم رخ فیزیولوژیک و آنتروپومتریک بازیکنان والیال وجود دارد(۱۲).

اوی و همکاران (۲۰۱۲) ارتباط اندازه‌های آنتروپومتریکی با میزان پرش عمودی در بازیکنان والیال مرد نخبه را بررسی کردند. نتایج نشان داد توان بی‌هوایی به طور معناداری در بازیکنان بلندقد بیشتر از بازیکنان کوتاه‌قد بود(۳). افضل‌پور (۱۳۸۸) ارتباط معناداری را میان برخی ویژگی‌های آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و روان‌شناختی با اجرای مهارت‌های والیال و موقعيت تیم‌ها نشان دادند(۱۴). ابراهیم (۱۳۸۴) در تحقیق خود اعلام کرد که از نظر مریبان باشگاهی ایران، شاخص‌های آنتروپومتریکی بیشترین اهمیت را برای شناخت افراد مستعد در رشته والیال دارند. از میان این شاخص‌ها طول قد مؤثرترین پارامتر است(۱۵). از این‌رو تحقیق حاضر برای نخستین بار مبادرت به اندازه‌گیری ویژگی‌های آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دختران نوجوان و ارائه الگو با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، نموده است. نتایج این مطالعه می‌توانند مبنای برای توصیف وضعیت آمادگی جسمانی و آنتروپومتریکی بازیکنان دختر تیم‌های مدارس ایران در نظر گرفته شود، تا سایر دانش‌آموزان علاقه‌مند به والیال به وسیله آن مورد ارزیابی قرار گیرند.

روش‌شناسی

طرح تحقیق از نوع مقطعی با ماهیت توصیفی بود. آزمودنی‌ها شامل ۱۷۶ دختر نوجوان والیالیست با میانگین سن 15 ± 3 سال بودند که در مسابقات قهرمانی مدارس کشور شرکت داشتند. تمامی شرکت‌کنندگان از ماهیت و هدف تحقیق مطلع بوده و پس از اعلام رضایت، به طور داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند با توجه به طرح تحقیق، در یک روز اندازه‌گیری‌های پیکری و ترکیب بدنی انجام و سپس طی دو روز متوالی آزمون‌های آمادگی جسمانی و فیزیولوژیک اجرا شد. ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی تمام آزمودنی‌ها بر اساس روش‌های استاندارد توصیه شده اندازه‌گیری گردید. آزمون‌ها در سالن ورزشی سرپوشیده انجام شد.

تمام اندازه‌گیری‌ها بر اساس روش‌های استاندارد آنتروپومتریکی توصیه شده توسط مک دوگال و ونگر اجرا شد(۶). اندازه‌گیری‌ها توسط یک شخص و با یک ابزار صورت پذیرفت. وزن و قد افراد به ترتیب با استفاده از ترازوی دیجیتالی و قدسنج نواری با دقیقه ۱/۰ کیلوگرم و ۰/۰ سانتی‌متر

اجرای تمرینات پردازند. عوامل آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در انتخاب افراد نخبه و موفقیت در یک رشته ورزشی هستند(۴، ۳). فرامرزی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی بیان کردند ساختار بدنی در هنگام اجرای فعالیت‌های ورزشی، تاثیر قابل توجهی بر عوامل فیزیولوژیکی دارد. آزمودنی‌های همسن که قد و اندام کوتاه‌تر داشتند، در هنگام اجرای یک فعالیت معین، ضربان قلب بیشتر، درک فشار کار بیشتر و تعداد تنفس بیشتری داشته و زودتر خسته شدند(۵).

والیال ورزشی هیجان‌انگیز و مفرح است که در بین سایر ورزش‌ها، جایگاه ویژه‌ای داشته و طرفداران فراوانی در سراسر جهان و هم‌چنین ایران دارد. بازیکنان والیال با توجه به ماهیت این ورزش و محیط بازی، از ویژگی‌های اختصاصی سهم تعیین‌کننده‌ای در رسیدن به اوج عملکرد ورزشی داشته و می‌توانند کسب موفقیت در رقابت‌های مختلف را افزایش دهند(۶). والیال یک ورزش بین‌الینی است، چرا که بازیکنان حرکات شدید و انفجاری را برای یک مدت نسبتاً طولانی (تقرباً ۹۰ دقیقه) تکرار می‌کنند. از این‌رو، بازیکنان والیال باید از نظر سیستم‌های تولید انرژی هوایی و بی‌هوایی کاملاً توسعه‌یافته باشند. هم‌چنین بازیکنان باید به لحاظ سیستم عصبی عضلانی جهت اجرای فعالیت‌های پرشی (دفاع و اسپک) و عکس‌العمل‌های سریع نیز ورزیده باشند(۷). داشتن ویژگی‌های آنتروپومتریک مناسب، از جمله قد بلند جزء عوامل مهم برای موفقیت در ورزش والیال است(۸).

ورزش والیال نیازمند مجموعه‌ای از قابلیت‌ها، از جمله بدنی، تکنیکی، تاکتیکی و روانی است. از میان این ویژگی‌ها، توانایی‌های بدنی بازیکنان اثرات قابل ملاحظه‌ای بر مهارت تکنیکی خود بازیکن، تاکتیک تیمی و حتی جنبه‌های روحی روانی دارد(۹). در بسیاری از تحقیقات دیده شده که ورزشکاران نخبه هر رشته ورزشی، خصوصیات آنتروپومتری و فیزیولوژیکی ویژه‌ای دارند(۱۰). به طورکلی با توجه به نظر محققان مختلف، معیارهای استعدادیابی در بیشتر رشته‌های ورزشی به چهار دسته ویژگی‌های آنتروپومتری، فیزیولوژیکی، روان‌شناختی و مهارتی تقسیم می‌شوند(۱۱). اگرچه مطالعات زیادی در مورد ویژگی‌های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک ورزشکاران رشته‌های ورزشی مختلف وجود دارد. به هر حال

آن‌گاه به ارزیابی و اندازه‌گیری کارایی واحد تصمیم‌ساز می‌پردازد. مدل تحلیل پوششی داده‌ها برخلاف بسیاری از مدل‌های مرسوم، در اندازه‌گیری کارایی می‌تواند شامل چندین ورودی و چندین خروجی باشد.

$$\text{Min } \theta$$

$$\text{s.t. } \sum_{j=1}^n \lambda_j X_j \leq \theta X_o$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j Y_j \geq Y_o$$

$$\lambda_j \geq 0, j = 1, \dots, n$$

مدل پوششی

یک واحد تصمیم‌گیرنده کار گفته می‌شود اگر و فقط اگر شرایط زیر برقرار باشند: $(1) = \theta^*$ در تمام جواب‌های بهینه مقادیر همه متغیرهای کمکی برابر صفر باشند(۲۳). برای انتخاب ماهیت الگو (DEA) در این پژوهش و نظر به این‌که ورزشکاران تمایل دارند فاکتورهایی از قبیل درصد چربی، زمان سرعت، زمان چاکی و... را کاهش دهند، بنابراین به عنوان ورودی انتخاب گردیدند و همچنین به این دلیل که ورزشکاران مایل به افزایش ویژگی‌های مانند قدرت، توان هوایی و... هستند، لذا به عنوان خروجی انتخاب شدند. پس از استاندارد سازی ورودی‌ها و خروجی‌ها، مقادیر در الگوی CCR گذاشته شد. میزان کارایی هر فرد و وزن داده‌ها به ورودی و خروجی‌های هر فرد مشخص گردید و سرانجام افراد کارا و ناکارا، مشخص گردید.

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۸ انجام گرفت. پس از تأیید توزیع نرمال توسط آزمون کلموگروف-اسمیرنف، داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. در سطح آمار توصیفی از شاخص‌هایی نظیر میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. میزان ($P \leq 0.05$) به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

میانگین، انحراف معیار شاخص‌های آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی بازیکنان در جدول (۱)، نیم‌رخ فیزیولوژیکی و آmadگی جسمانی در جدول (۲) ارائه شده است. نتایج آزمون

به ترتیب اندازه گیری شد. شاخص‌های ترکیب بدنی شامل درصد چربی با استفاده از کالیپر و مطابق با فرمول سه نقطه‌ای جکسون (سه سربازویی، شکم و فوق خاصره) اندازه‌گیری گردید(۱۶). شاخص توده بدنی (BMI)، نسبت دور کمر به باسن (WHR)، توده بدون چربی (LBM) نیز محاسبه شد(۱۷). سپس بر اساس روش ایساک (ISAC) تمامی اندازه‌های پیکری شامل محیط اندام‌ها (کمر، باسن، شکم) و طول اندام‌ها (قد ایستاده، طول دست، طول پا) به وسیله متر آنتروپومتری از سمت راست بدن اندازه‌گیری و ثبت گردید(۱۸).

ویژگی‌های آmadگی جسمانی که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند شامل: چابکی عمومی، توان پایین‌تنه و توان هوایی بود. شاخص چابکی با آزمون 4×9 متر(۸)، توان پایین‌تنه با پرش سارجنت(۹) و توان هوایی با آزمون میدانی ۲۰ متر شاتل ران(۹)، اندازه گیری شد. استقامت عضلات شکم (درازو نشست در یک دقیقه)(۸)، انعطاف‌پذیری (تنه به جلو اصلاح شده)(۲۰)، قدرت پنجه (دینامومتر دیجیتالی سیهان ساخت کره)(۲۱) و دامنه حرکتی مفصل شانه (در این آزمون ورزشکار به روی سینه دراز کشیده و سعی می‌کند دست‌های خود را بدون تا کردن آرنج به طور مستقیم تا حد امکان بالا بیاورد)(۲۲)، اندازه گیری شد.

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)^۱ یک روش برنامه‌ریزی ریاضی، جهت ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌گیرنده است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سیستم را در شاخص‌های مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آن‌ها، خط مشی سیستم را به سوی ارتقای کارایی و بهره‌وری مشخص می‌کند. همچنین الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا بر اساس آن‌ها انجام گرفته است به واحدهای ناکارا معرفی می‌شوند. الگوهای کارا واحدهایی هستند که با ورودی‌های مشابه واحد ناکارا خروجی‌های بیشتر یا همان خروجی‌ها را با استفاده از ورودی‌های کمتر تولید کرده‌اند. تحلیل پوششی داده‌ها، یک چارچوب تئوریک را برای تحلیل عملکرد و اندازه گیری کارایی، فراهم می‌آورد. مدل مذکور شامل مجموعه‌ای از تکنیک‌های برنامه‌ریزی خطی است که مرز کارا را با استفاده از داده‌های مشاهده شده بنا می‌کند و

۱- Data Envelopment Analysis (DEA)

($P=0.001$ و $r=0.323$) مشاهده شد. ارتیباط معکوس و معناداری میان انعطاف پذیری و درصد چربی ($P=-0.205$ و $r=0.30$) دیده شد. ارتیباط معنادار و مثبتی بین قدرت با توده بدون چربی ($P=0.006$ و $r=0.268$ ، طول دست ($P=0.001$ و $r=0.399$) و میزان قد ($P=0.001$ و $r=0.432$) وجود داشت.

همبستگی پرسون در دو سطح معناداری ($p \leq 0.01$ و $p \leq 0.05$) بررسی و در جدول (۳) بیان شده است. یافته‌ها نشان داد بین پرش (توان پایین تنہ) با طول پا همبستگی مثبت معنادار ($r=0.203$ و $P=0.048$) و همبستگی منفی و معنادار با درصد چربی ($r=-0.192$ و $P=0.057$) و شاخص توده بدنی ($r=-0.203$ و $P=0.047$) وجود دارد. همبستگی مثبت بین توان هوایی با طول قد ($r=0.355$ و $P=0.001$) و توده بدون چربی ($P=0.001$) وجود دارد.

جدول ۱. خلاصه نتایج بدست آمده از ویژگی‌های آنتروپومتری و ترکیب بدنی

متغیر	میانگین ± انحراف معیار	متغیر	میانگین ± انحراف معیار	متغیر
طول دست(cm)	۵۶/۱۶±۸/۶	وزن(kg)		
دور باسن(cm)	۲۱/۶۷±۷/۵۷	شاخص توده بدنی(kg/m^2)		
نسبت دورکمر به باسن WHR(cm)	۷۳/۶۱±۶/۶۸	طول پا(cm)		
قد(cm)	۷۱/۲۸±۵۷/۱۷	دور شکم(cm)		
درصد چربی(BF %)	۴۶/۷۹±۵/۶۴	توده بدون چربی(LBM)(kg)		

*مقادیر بصورت میانگین ± انحراف معیار ارایه شده است.

جدول ۲. خلاصه نتایج بدست آمده از ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی

متغیر	میانگین ± انحراف معیار	متغیر	میانگین ± انحراف معیار	متغیر
قدرت پنجه دست(kg)	۳۲/۵۲±۹/۸	دامنه حرکتی مفصل شانه(cm)		
چابکی(s)	۳۴/۳۵±۴/۸۷	توان هوایی(m/kg/min ⁻¹)		
درازونشست(n)	۳۴/۳۸±۵/۳۹	توان پایین تنہ(cm)		

*مقادیر بصورت میانگین ± انحراف معیار ارایه شده است.

جدول ۳. همبستگی بین برحی از ویژگی‌های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی

توان پایین تنہ (پرش)	دامنه حرکتی مفصل شانه	قدرت	انعطاف پذیری	توان هوایی
$r=-0.205$		$r=-0.205$		$r=-0.192$
$P=-0.30*$		$P=-0.30*$		$P=-0.057*$
$r=-0.246$		$r=-0.432$		طول دست(cm)
$P=-0.12*$		$P=-0.001**$	$P=-0.12*$	$r=-0.203$
				$P=-0.048*$
$r=-0.399$			$r=-0.355$	قد(cm)
$P=-0.001**$			$P=-0.001**$	شاخص توده بدنی(kg/m^2)
$r=-0.268$			$r=-0.323$	$P=-0.047*$
$P=-0.06**$			$P=-0.001**$	توده بدون چربی(kg)

*ضریب همبستگی در سطح 0.05 معنادار است. **ضریب همبستگی در سطح 0.01 معنادار است.

بحث

میانگین وزن نوجوانان ایرانی 56.16 ± 8.6 کیلوگرم به دست آمد که در مقایسه با تحقیق سینوویک و همکاران (۲۰۰۳) که میانگین وزن 59.7 ± 5.7 کیلوگرم و ملروس و همکاران (۲۰۰۷) که میانگین وزن 59.6 ± 8.2 کیلوگرم، کمتر بود (۸). میانگین شاخص توده بدن دختران نوجوان والیالیست ایران 21.67 ± 7.57 کیلوگرم بر مترمربع، نسبت دور کمر به دور باسن $WHR = 0.402 \pm 0.02$ سانتی متر و توده بدون چربی $LBM = 46.79 \pm 5.64$ کیلوگرم، محاسبه و مشخص گردید. در مطالعه حاضر رابطه معناداری میان توده بدون چربی با توان هوای مشاهده شد و نشان داد که هرچه توده بدون چربی بیشتر باشد توان هوای هم بیشتر است ($p=0.001$). همچنین رابطه معناداری میان قدرت و توده بدون چربی مشاهده شد که بیانگر این مطلب است که هر چه توده بدون چربی بیشتر باشد، قدرت هم بیشتر است ($p=0.006$).

در پژوهش حاضر، شاخص توده بدنی دختران نوجوان والیالیست ایران 21.67 ± 7.57 کیلوگرم بر مترمربع، بود. این شاخص به جز ارتباط معنادار و منفی با میزان پرش عمودی (۰.۰۴۷) ($p=0.047$) با سایر متغیرها رابطه معناداری نداشت. همچنین طی بررسی های صورت گرفته در مسابقات جهانی از سال ۲۰۱۱-۲۰۰۳ شاخص توده بدنی در تیم های شرکت کننده در رده نوجوانان با میانگین نسبتاً ثابت 21.33 ± 0.8 مطرح شده است (۳۰). این مطلب بیانگر آن است که شاخص توده بدنی می تواند یکی از شاخص های انتخابی مناسب برای نوجوانان در سطح ملی باشد.

مقایسه شاخص توده بدون چربی تحقیق حاضر با والیالیست های پژوهش ملروس و همکاران 46.4 ± 4.9 کیلوگرم، تقریباً برابر بودند (۸). مطالعات نشان می دهنده که والیالیست ها به طور کلی و بدون در نظر گرفتن پست بازی از درصد چربی پایینی برخوردار هستند (۳۲، ۳۱). وزن و توده چربی بالا به طور منفی عملکرد ورزشی را متاثر می سازد (۳۱). میانگین و انحراف معیار درصد چربی شامل نقاط سه سریازویی، شکم و فوق خاصره در دختران نوجوان والیالیست ایران 15.25 ± 3.22 درصد و در مقایسه با نتایج تحقیق ملروس و همکاران (۲۰۰۷) 20.45 ± 4.08 درصد، سینوویک و همکاران (۲۰۰۳) 18.43 ± 3.2 درصد، کمتر بود (۸، ۲۷). فاکتورهای آنتروپومتریکی به ویژه طول اندام تحتانی از عوامل بسیار مهم برای بازیکنان والیالی، در برتری روی تور

اطلاعات بسیار اندکی در مورد ویژگی های جسمانی دختران والیالیست ایران وجود دارد. پژوهش حاضر، با توصیف و ارتباط سنجی نیم رخ آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی، ویژگی های آمادگی جسمانی و فیزیولوژیک بازیکنان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی مدارس این امکان را فراهم ساخت تا دیدگاه بهتری در مورد دختران نوجوان والیالیست ایرانی به دست آید. در این تحقیق اطلاعات برخی از ویژگی های آنتروپومتری و ترکیب بدنی دختران نوجوان والیالیست ایران آورده شده است. نتایج به دست آمده با اندک مطالعات انجام شده که همگی در رده سنی شرکت کنندگان در مطالعه حاضر 15.3 ± 1.5 سال بودند، مقایسه گردید. سابقه حضور نوجوانان در تیم 11.4 ± 1.1 سال بود.

یکی از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت والیالیست ها، اندازه قد بازیکنان می باشد (۲۴). بایوز و همکاران (۲۰۰۶)، تفاوت های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و نوع پیکری زنان نسبه در رشته های بسکتبال، والیالی و هندبال را در لیگ یونان مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که والیالیست ها نسبت به سایر بازیکنان داری قد بلندتری بودند (۲۵، ۲۶). در ورزش والیالی، تیم ها با استفاده از مهارت های اسپک و دفاع در ارتفاع بالا با هم رقابت می کنند و ضربه زدن به توپ در ارتفاع بالاتر امتیازی برای برنده شدن است. این موضوع با این واقعیت که تیم ها با میانگین قدم بلندتر جایگاه بهتری در ردبهانی جهانی کسب کرده اند، همخوانی دارد (۲۷). با توجه به اهمیت فاکتور قد در رشته والیالی، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین قد بازیکنان ایران 164.9 ± 7.63 سانتی متر است، مقایسه اندازه قد به دست آمده با تحقیقات انجام شده در رده سنی نوجوانان مانند پژوهش سینوویک و همکارانش (168.5 ± 5.8) (۲۰۰۳)، سانتی متر (۲۷)، رانی استام (۲۰۰۴) 166.22 ± 2.1 سانتی متر (۲۸)، سانتی متر (۲۰۰۷)، رانی استام (۲۰۰۴) 179.2 ± 1.0 سانتی متر (۲۹)، ملروس و همکاران (۲۰۰۷) 169 ± 0.8 سانتی متر (۸) نشان دهنده آن است که میانگین قد دختران نوجوان ایرانی نسبت به نتایج سایر کشورها کوتاه تر است. بنابراین مریبان در سطوح مختلف پایه و در بحث استعدادیابی باید به فاکتور قد، توجه بیشتری داشته باشند.

روی تور است. ساتلر و همکاران (۲۰۱۲) بیان کردند پرش عمودی از مهم‌ترین شاخص‌های فیزیولوژیکی در ورزش والیال است (۳۶). به همین منظور توان پایین‌تنه دختران والیالیست ایران اندازه‌گیری شد. در آزمون فوق میزان پرش $34/38 \pm 5/39$ سانتی‌متر بود. پس از مقایسه توان پایین‌تنه دختران نوجوان ایران با نوجوانان تحقیق گابت و همکاران (۲۰۰۷) $41/5 \pm 0/9$ سانتی‌متر (۲۹)، ملروس و همکاران (۲۰۰۷) $35/5 \pm 6/2$ سانتی‌متر گزارش شد که در مقایسه با نوجوانان تحقیق حاضر در سطح بهتری بودند (۸).

والیالیست‌ها نیازمند قابلیت ستاد گیری سریع، کاهش ستاد، تغییر مسیر و انعطاف پذیری در زمین بازی هستند (۳۷). چابکی در دریافت‌های اول، توب گیری، دفاع روی تور، ارسال انواع پاس‌ها و دیگر مهارت‌های بازی والیال در شرایط مختلف ضروری است (۳۸). در پژوهش حاضر، میانگین آزمون چابکی $10/11 \pm 0/69$ ثانیه بود که با توجه به نبود نرم ملی و تفاوت گروه سنی، جنسیت و بعضًا نوع آزمون‌ها، قابلیت مقایسه با مقالات مشابه وجود نداشت. داشتن انعطاف‌پذیری از مهم‌ترین فاکتورهایی است که باعث موفقیت والیالیست در دریافت‌های اول و توب گیری می‌شود. به طور مثال پاسورها بدون انعطاف مناسب نمی‌توانند انواع پاس‌بلند، کوتاه، بریده و... را در شرایط مختلف به نحو مطلوب ارسال نمایند (۲۷). در این مطالعه ارتباط معکوس و معناداری میان انعطاف‌پذیری و درصد چربی ($0/20 \pm 0/03$ و $P=0/030$) دیده شد. ضمن بررسی انعطاف‌پذیری تنہ نوجوانان تحقیق حاضر و تحقیق ملروس و همکاران (۲۰۰۷) مشخص شد که سطح انعطاف‌پذیری دختران والیالیست مطالعه حاضر با دختران نوجوان آمریکا تقریباً برابر بودند $38/40 \pm 7/60$ در مقابل $38/7 \pm 7/1$ سانتی‌متر (۸).

در اغلب اوقات قدرت دست به عنوان معیاری برای قدرت کل بدن استفاده می‌شود. در بازی‌های توبی از جمله والیال که استفاده از دست‌ها ضروری است، ویژگی عملکردی دست از اهمیت زیادی برای اجرای مناسب برخوردار است (۳۲). هم‌چنین والیال شامل تکرار پرش، دفاع، اسپک، ضربات قدرتی و پاس است که لازمه آن سطح بالایی از قدرت است (۲۷). برای اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومنتریک دست و عضلات ساعد از دینامومتر دیجیتالی استفاده شد که میانگین قدرت دست والیالیست‌های نوجوان ایران $41/44 \pm 26/71$ کیلوگرم بود. در مقابل تحقیق ملروس و همکاران (۲۰۰۷) که

(اسپک و دفاع) عنوان شده است (۳۳). بر همین اساس طول پا اندازه‌گیری $73/61 \pm 6/68$ سانتی‌متر بود. که در مطالعه حاضر نیز ارتباط معناداری بین میزان پرش و طول پا ($p=0/048$) در آزمودنی‌ها مشاهده شد.

لیدور و همکاران (۲۰۱۰) بیان کردند طول دست با بیشتر مهارت‌های تکنیکی والیال، به ویژه ضربه زدن همبستگی دارد. هم‌چنین برای بیشترین استفاده از سرعت به دست آمده هنگام چرخاندن دست، بازیکنان با دستان کشیده‌تر، برتری دارند (۳۴). طول دست نوجوانان شرکت‌کننده در تحقیق حاضر $79/47 \pm 4/88$ سانتی‌متر بود که رابطه معناداری میان طول دست و میزان دامنه حرکتی مفصل شانه مشاهده گردید ($p=0/012$). هر سه دستگاه تولید انرژی نقش مهمی در مجموع دوره‌های کار و استراحت، در والیال سالانه دارند. از طرفی بازیکنان والیال نیاز به حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینه مانند ورزش‌های استقاماتی ندارند، اما سطح بالایی از توان هوایی را برای اجرای مسابقات با مدت زمان طولانی نیاز دارند (۲۷). با توجه به اهمیت توان هوایی در والیالیست‌ها در تحقیق حاضر فاکتور توان هوایی $34/35 \pm 4/87 \text{ m/kg/min}^{-1}$ بود. در این پژوهش میانگین توان هوایی بازیکنان نوجوان، نسبت به مقادیر گزارش شده در مقالات مشابه گابت و همکاران (۲۰۰۷)، $41/2 \pm 0/9 \text{ m/kg/min}^{-1}$ و لئون و همکاران (۲۰۰۳)، $48/9 \pm 3/6 \text{ m/kg/min}^{-1}$ (۳۵) که از آزمون شاتل ران برای اندازه‌گیری توان هوایی استفاده کردند، ضعیفتر بود.

در مطالعه پیش‌رو میزان دامنه حرکتی مفصل شانه $40/95 \pm 10/23$ سانتی‌متر و تعداد درازونشیست آن $40/4 \pm 5/6$ سانتی‌متر و تعداد درازونشیست آن‌ها کمتر بود. از نوجوانان ایران بیشتر و تعداد درازونشیست آن‌ها کمتر بود. از سویی، بازیکنان والیال برای اجرای اسپک، دفاع و اعمال پرشی که به طور مکرر حین بازی انجام می‌شود، به سطوح بالایی از توان عضلانی پایین‌تنه نیاز دارند (۹). از طرفی با توجه به بست بازی، بازیکنان از مهارت پرش استفاده می‌کنند که به دو شکل پرش درجا و سه‌گام است. مانند مهاجم پشت خط زن که اغلب پرش‌ها 60 درصد از نوع سه‌گام است، در حالی که دیگر بازیکنان بیشتر پرش درجا را در طول مسابقه انجام می‌دهند (۲۷). موفقیت تیم مستلزم عبور توب یا دفاع آن بر

نتیجه‌گیری

پس از بررسی ویژگی‌های آنtrapوپومتریکی، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنش دختران نوجوان تحقیق حاضر و مقایسه آنها با تحقیقات بسیار محدود انجام شده، دریافتیم، نوجوانان ایرانی در برخی از فاکتورها از جمله وزن بدن، درصد چربی، دامنه حرکتی مفصل شانه، انعطاف پذیری برتری داشته و در برخی دیگر شاخص‌ها مانند قد، درازونشست، توان هوایی و پرش ضعیف عمل کرده و دارای کمبودهایی بودند. آگاهی از این اجزا می‌تواند در استعدادیابی ورزشی و طراحی برنامه‌های تمرینی برای مریبان مفید باشد. با توجه به نتایج تحلیل پوششی داده‌ها در کل به این نتیجه رسیدیم که افراد راه یافته به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی مدارس کشور در سطح خوبی قرار داشته و بیشتر آنها کارا شناخته شدند. نوجوانان پشتوانه و سرمایه‌های آتی والیبال کشور هستند. توجه به ابعاد مختلف تأثیرگذار در هدایت و بهره‌گیری بهینه از این گروه، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود مریبان و معلمان ورزش در مدارس از اطلاعات ارائه شده در این مقاله جهت استعدادیابی و انتخاب دانش‌آموزان مستعد، استفاده کنند.

تشکر و قدردانی

از ورزشکاران گرامی، مریبان و اساتید محترمی که در انجام این مطالعه ما را یاری نمودند، سپاسگزاری می‌نماییم.

از همین روش برای اندازه‌گیری قدرت دست والیبالیست‌ها استفاده نمودند $5/5 \pm 5/4$ کیلوگرم گزارش گردید(۸). در پژوهش حاضر میان قدرت با توده بدون چربی ($P=0/006$) ارتباط معنادار و مثبتی وجود داشت. ابراهیم و همکاران (۱۳۸۴) در پژوهشی در مورد استعدادیابی در رشته والیبال نتیجه گرفتند که عوامل یا شاخص‌های متعددی می‌تواند در فرایند استعدادیابی در والیبال لحاظ گردد و نمی‌توان تنها به شاخص‌های یک حیطه خاص توجه نمود، شاخص‌های مربوط به برخی حیطه‌ها بیشتر از بقیه سهیم هستند(۱۵).

با در نظر گرفتن نتایج الگوی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در این تحقیق موارد زیر قابل اشاره است: از بین ۱۳۳ نفری که در مدل قراردادیم تعداد ۱۱۳ نفر کارا شناخته شدند. در کل ۸۴ درصد از افراد موجود کارا و ۱۶ درصد ناکارا تشخیص داده شدند. با توجه به نتایج الگو برای هر یک از افراد ناکارا فرد مرجع یا الگویی معین شده است که مریبی، می‌تواند با توجه به الگو قراردادن مرجع مشخص شده داشش آموز را به مرز کارایی جهت قرار گرفتن در میان افراد کارا برساند. به طور مثال، نفر سوم می‌تواند با الگو برداری ترکیبی از ویژگی‌های جسمانی و حرکتی نفرات یازدهم، پنجم و هشتم، نود و پنجم و نود و نهم قرار داده شده در برنامه ریاضی، به مرز کارایی برسد.

منابع

1. Claessens AL, Hlatky S, Lefevre J, Holdhaus H. The role of anthropometric characteristics in modern pentathlon performance in female athletes. Journal of sports sciences. 1994 Aug;12(4):391-401.
2. Toriola AL, Adeniran SA, Ogunremi PT. Body composition and anthropometric characteristics of elite male basketball and volleyball players. The Journal of sports medicine and physical fitness. 1987 Jun;27(2):235-9.
3. Smith DJ, Roberts D, Watson B. Physical, physiological and performance differences between Canadian national team and universiade volleyball players. Journal of sports sciences. 1992 Apr;10(2):131-8.
4. Bertini I, Pujia A, Giampietro M. A follow-up study of the variations in the body composition of karate athletes. Acta diabetologica. 2003 Oct;40 Suppl 1:S142-4. PubMed
5. Faramarzi M GR CC. Physical fitness profile of elite football players of Iran. Olympic Journal. 2011;1(49):127-40[in Persian].
6. Marques MC, van den Tillaar R, Gabbett TJ, Reis VM, Gonzalez-Badillo JJ. Physical fitness qualities of professional volleyball players: determination of positional differences. Journal of strength and conditioning research. 2009 Jul;23(4):1106-11.
7. Gabbett T, Georgieff B. Physiological and anthropometric characteristics of Australian junior national, state, and novice volleyball players. Journal of strength and conditioning research. 2007 Aug;21(3):902-8.
8. Melrose DR, Spaniol FJ, Bohling ME, Bonnette RA. Physiological and performance characteristics of adolescent club volleyball players. Journal of strength and conditioning research. 2007 May;21(2):481-6.
9. Chatterjee P, Banerjee AK, Das P, Debnath P, Chatterjee P. Validity of 20 meter multi stage shuttle run test for prediction of maximum oxygen uptake in Indian female university students. Kathmandu Univ Med J (KUMJ). 2008 Apr-Jun;6(2):176-80.
10. Jafari H MMR, Gharakhanlou R. Describe and the relationship between anthropometric and physiological characteristics of successful taekwondo,. Olympics. 2007;36:7-16.[in Persian]
11. Vaeyens R, Lenoir M, Williams AM, Philippaerts RM. Talent identification and development programmes in sport : current models and future directions. Sports medicine (Auckland, NZ). 2008;38(9):703-14.
12. Shavandi N, Saremi A. Physiological and anthropometric characteristic of Iranian national volleyball players according to their playing position. Metabolism and Exercise. 2012;2(1):[in Persian]

13. Aouadi R, Jlid MC, Khalifa R, Hermassi S, Chelly MS, Van Den Tillaar R, et al. Association of anthropometric qualities with vertical jump performance in elite male volleyball players. *The Journal of sports medicine and physical fitness*. 2012 Feb;52(1):11-7.
14. Afzalpour MR E. Predict success in volleyball physiological and psychological characteristics of the body of the female players in South Khorasan province. *Sport physiology*. 2011;2(23):101-16.[in Persian]
15. EbrahimK. HM MA. describes the status quo and develop indicators talent in volleyball. *Sports Science Research*. 2005;5:15.[in Persian]
16. Heyward VH, Stolarczyk LM. Applied Body Composition Assessment: Human Kinetics; 1996.
17. Konarski J. Characteristics of differences in energy expenditure and heart rate during indoor and outdoor field hockey matches. *Journal of Human Sport and Exercise*. 2010;5(1):43-58.
18. Stewart A, Marfell-Jones M, Olds T, De Ridder J. International Standards for Anthropometric Assessment2011.
19. Bosco C, Luhtanen P, Komi PV. A simple method for measurement of mechanical power in jumping. *European journal of applied physiology and occupational physiology*. 1983;50(2):273-82.
20. Hosler WW, Morrow JR, Jr., Jackson AS. Strength, anthropometric, and speed characteristics of college women volleyball players. *Research quarterly*. 1978 Oct;49(3):385-8.
21. Fernandez-Rio J, Méndez-Giménez A. Talent detection and development in soccer: A review2014. 7-18 p.
22. Harput G, Guney H, Toprak U, Kaya T, Colakoglu FF, Baltaci G. Shoulder-Rotator Strength, Range of Motion, and Acromiohumeral Distance in Asymptomatic Adolescent Volleyball Attackers. *Journal of athletic training*. 2016 Sep;51(9):733-8. PubMed PMID: 27813683. Pubmed Central
23. Barros CP, Leach S. Performance evaluation of the English Premier Football League with data envelopment analysis. *Applied Economics*. 2006 2006/07/10;38(12):1449-58.
24. Zaccagni L, Onisto N, Gualdi-Russo E. Biological characteristics and ageing in former elite volleyball players. *Journal of science and medicine in sport*. 2009 Nov;12(6):667-72.
25. Bayios IA, Bergeles NK, Apostolidis NG, Noutsos KS, Koskolou MD. Anthropometric, body composition and somatotype differences of Greek elite female basketball, volleyball and handball players. *The Journal of sports medicine and physical fitness*. 2006 Jun;46(2):271-80.
26. Salimi Avansar A, Tavakoli khormiza A, Azarniveh M. Analyzing energy system in volleyball athletes contributing in Iran super-league games. *Sport Physiology*. 2015;6(24):85-98.[in Persian]
27. Tsunawake N, Tahara Y, Moji K, Muraki S, Minowa K, Yukawa K. Body composition and physical fitness of female volleyball and basketball players of the Japan inter-high school championship teams. *Journal of physiological anthropology and applied human science*. 2003 Jul;22(4):195-201..
28. Stamm R, Veldre G, Stamm M, Thomson K, Kaarma H, Loko J, et al. Dependence of young female volleyballers' performance on their body build, physical abilities, and psycho-physiological properties. *The Journal of sports medicine and physical fitness*. 2003 2003/09//;43(3):291-9.
29. Gabbett TJ. Physiological and anthropometric characteristics of elite women rugby league players. *Journal of strength and conditioning research*. 2007 Aug;21(3):875-81..
30. Salimi Avansr M. The changes in individual characteristics and performance and their relationship with results teenage boys volleyball national teams participating in the last five World Cup. Master's thesis, University of Shahid Beheshti48-5. 2015 [in Persian].
31. Duncan MJ, Woodfield L, al-Nakeeb Y. Anthropometric and physiological characteristics of junior elite volleyball players. *British journal of sports medicine*. 2006 Jul;40(7):649-51; discussion 51.
32. Nevill AM, Holder RL. Modelling handgrip strength in the presence of confounding variables: results from the Allied Dunbar National Fitness Survey. *Ergonomics*. 2000 Oct;43(10):1547-58..
33. Stanganelli LC, Dourado AC, Oncken P, Mancan S, da Costa SC. Adaptations on jump capacity in Brazilian volleyball players prior to the under-19 World Championship. *Journal of strength and conditioning research*. 2008 May;22(3):741-9.
34. Lidor R, Ziv G. Physical characteristics and physiological attributes of adolescent volleyball players-a review. *Pediatric exercise science*. 2010 Feb;22(1):114-34.
35. Leone M, Lariviere G, Comtois AS. Discriminant analysis of anthropometric and biomotor variables among elite adolescent female athletes in four sports. *Journal of sports sciences*. 2002 Jun;20(6):443-9.
36. Sattler T, Sekulic D, Hadzic V, Uljevic O, Dervisevic E. Vertical jumping tests in volleyball: reliability, validity, and playing-position specifics. *Journal of strength and conditioning research*. 2012 Jun;26(6):1532-8.
37. Gabbett TJ, Georgieff B. The development of a standardized skill assessment for junior volleyball players. *International journal of sports physiology and performance*. 2006 Jun;1(2):95-107..
38. Scates AE, Linn M, Kowalick V. Complete Conditioning for Volleyball: Human Kinetics; 2003.

A study of anthropometric characteristics, physical fitness and body composition of adolescent Iranian female volleyball players

Omidali F^{*1}, Saremi A², Shavandi N², Moazami Godarzi MR³

1-Lecturer, MS in Sport Sciences Department, University ayatollah Borujerdi, Borujerd, Iran

2- Associate Professor, Sport Physiology, Arak University, Arak, Iran

3- Assistant Professor, Applied Mathematics, Islamic Azad University of Borujerd, Borujerd, Iran

*Corresponding: University ayatollah Borujerdi, Borujerd, Iran

Received: 2015/10/23 **Revised:** 2015/12/05 **Accepted:** 2016/02/16

Abstract

***Correspondence:**

Email:

f.omidali@abru.ac.ir

Introduction: Physical fitness and physical structure has an important role in the success of athletes. To have knowledge of body characteristics and to know the physiological aspects of the body is important in every sport and for every athlete. This study was conducted to explore the anthropometric characteristics, physical fitness and body composition of adolescent Iranian girls' volleyball players and provide a model using Data Envelopment Analysis (DEA).

Methods: 172 female volleyball players from many provinces of the country participated in the study with the age range of (15.33 ± 1.5) years. The body composition factors which were measured were weight, body mass index, fat, WHR, fat-free mass and anthropometric parameters: height, arm length and leg length. Physiological variables and physical fitness including power (vertical jump), agility, flexibility, shoulder rotation, grip strength, sit-up and aerobic capacity were also measured. Pearson correlation coefficient, Descriptive Statistics and mathematical methods (DEA) was used for data analysis ($P \leq 0.05$).

Results: Data showed that there were significant differences between jumping leg length, body fat percentage, body mass index and fat percentage and flexibility. Compared to some previous studies, the participants had more strength and shoulder rotation and had lower aerobic capacity, Sit-up, power (vertical jump), height, weight and body fat percentage. According to the DE results, 84% of the participants were diagnosed as efficient.

Conclusion: The results of this study could be a suitable model for talent identification and selection of volleyball players.

Key Words: Volleyball, body composition, anthropometric characteristics, data envelopment analysis.