

مقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی و Fat_{\max} بین مردان سالمند فعال و غیرفعال

مهرداد فتحی^{۱*}، بهنام روزبه^۲، مهدی سیفی رضوانی^۳

۱- دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

۲- دکتری بیوشیمی و متاپولیسم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

۳- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران

* نشانی نویسنده مسئول: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

Email: Mfathei@um.ac.ir

وصول: ۱۳۹۷/۶/۱۲ | اصلاح: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی و شدتی از فعالیت ورزشی که حداکثر اکسیداسیون چربی در آن رخ می‌دهد (Fat_{\max})، بین مردان سالمند فعال و غیرفعال بود.

روش‌شناسی: ۱۰ مرد سالمند سالم که فعالیت ورزشی منظم داشتند (حداقل ۱۰ سال گذشته، حداکثر اکسیژن مصرفی $44/64 \pm 4/52$ میلی‌لیتر بر کیلوگرم در دقیقه) و ۱۰ مرد سالمند سالم که فعالیت ورزشی منظم نداشتند (حداقل ۱۰ سال گذشته، حداکثر اکسیژن مصرفی $30/92 \pm 3/25$ میلی‌لیتر بر کیلوگرم در دقیقه)، به عنوان آزمودنی این پژوهش انتخاب شدند، سپس آزمودنی‌ها ساعت هشت تا ۱۰ صبح در حالت ناشتا، آزمون فعالیت ورزشی فرازینده شامل؛ فعالیت با مراحل سه‌دقیقه‌ای را روی نوارگردان تا مرحله خستگی انجام دادند. مقدار حداکثر اکسیداسیون چربی و Fat_{\max} کالری‌سنجدی غیرمستقیم با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی و با کمک معادلات عنصرستنجی محاسبه شد. به منظور مقایسه متغیرها، آزمون آماری تی مستقل در سطح $p < 0.05$ ، استفاده شد.

یافته‌ها: میزان اکسیداسیون چربی در دامنه‌ای از شدت‌ها، حداکثر اکسیداسیون چربی و Fat_{\max} در افراد سالمند فعال به طور معنی‌داری بیشتر از غیرفعال، بود ($p < 0.05$). اما، میزان اکسیداسیون کربوهیدرات در دامنه‌ای از شدت‌ها به طور معنی‌داری در افراد سالمند فعال نسبت به غیرفعال، کمتر بود ($p < 0.05$).

بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی، مشخص شد که وضعیت آمادگی جسمانی بهتر در افراد سالمند فعال، با میزان اکسیداسیون چربی بیشتر و اکسیداسیون کربوهیدرات کمتر، همراه است. به علاوه در افراد سالمند میزان حداکثر اکسیداسیون چربی و Fat_{\max} کاهش می‌یابد، اما با تمرین ورزشی منظم می‌توان تا حدی از این کاهش جلوگیری کرد.

واژه‌های کلیدی: حداکثر اکسیداسیون چربی، Fat_{\max} ، وضعیت آمادگی جسمانی، مردان سالمند.

مقدمه

افزایش سن با تغییرات در ترکیب بدن همراه است که شامل کاهش توده خالص بدن و افزایش چربی بدن می‌باشد. این تغییر در ترکیب بدن به عنوان یک عامل خطرزا برای بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت در نظر گرفته می‌شود(۱). افزایش سن با افزایش می‌یابد که از دلایل آن می‌توان کاهش متاپولیسم پایه و سطح فعالیت بدنی را نام بردن(۲). این افزایش در توده چربی در افراد سالمند می‌تواند نتیجه عدم تعادل بین دریافت چربی و استفاده از چربی به عنوان سویسترا

در اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات، شدت و مدت فعالیت ورزشی هستند. چندین مطالعه رابطه بین شدت فعالیت ورزشی و اکسیداسیون چربی را در افراد جوان توصیف کرده‌اند، به این صورت که میزان اکسیداسیون چربی از شدت کم تا متوسط افزایش و قوی که شدت بیشتر می‌شود، کاهش می‌یابد^(۱۴-۱۵). اگرچه، وقتی که فعالیت ورزشی برای دوره طولانی ادامه می‌یابد، سهم چربی به عنوان منبع انرژی نیز افزایش می‌یابد^(۱۶)؛ اما با افزایش شدت فعالیت ورزشی، میزان اکسیداسیون کربوهیدرات افزایش می‌یابد. با این حال، درباره رابطه بین شدت فعالیت ورزشی و میزان اکسیداسیون سوبسترا در افراد سالمند فعال و غیرفعال، اطلاعات کمی در دسترس می‌باشد و اکثر تحقیقات فقط در سه یا چهار شدت مجزا، این این رابطه را بررسی کرده‌اند. از یک نظر، تمرکز مطالعه حاضر بر این جهت تولید انرژی مصرف می‌کند را حداکثر اکسیداسیون بدنی جهت از فعالیت که بیشترین میزان چربی^(۴) (MFO) و شدتی از فعالیت که کاهش اکسیداسیون چربی در آن شدت رخ می‌دهد را Fat_{\max} می‌نامند^(۱۷). در تحقیقات پیشین اثر متغیرهای مختلف بر MFO و Fat_{\max} بررسی شده است، اما اثر افزایش سن که با کاهش اکسیداسیون چربی همراه است، موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وضعیت آمادگی جسمانی افراد، درجایی که افراد تمرین کرده و تمرین نکرده جوان در سطوح متفاوتی از شدت فعالیت ورزشی به اوج اکسیداسیون چربی می‌رسند، عامل مهم دیگری است، به این معنی که اوج اکسیداسیون چربی در افراد تمرین کرده استقامتی در شدت‌های بالاتر فعالیت ورزشی روی می‌دهد. به علاوه، نتایج مطالعات گذشته در مورد اثر وضعیت آمادگی جسمانی بر MFO و Fat_{\max} ، ضدوقیض بوده است. به طوری که آچتن و همکاران^(۱۸) تفاوت معنی‌داری در Fat_{\max} افراد با $\text{VO}_{2\max}$ بالا و پایین مشاهده نکردند. استیسن و همکاران^(۱۹) نیز تفاوتی بین افراد تمرین کرده و تمرین نکرده در میزان MFO و Fat_{\max} را گزارش نکردند؛ اما نوردبی و همکاران^(۲۰) نشان دادند که MFO و Fat_{\max} در افراد تمرین کرده نسبت به تمرین نکرده بیشتر است. لیما و

باشد^(۳). تغییر در استفاده از چربی به عنوان سوپسترا که باعث افزایش سطوح چربی بدن در افراد سالمند می‌شود ممکن است تا حدی به دلیل کاهش در انتقال و اکسیداسیون چربی باشد^(۴). هم‌چنین مشخص شده، اکسیداسیون چربی در افراد سالمند در مقایسه با افراد جوان در شرایط بعد از صرف غذا، استراحت و در طی فعالیت ورزشی با شدت متوسط، کمتر است^(۳,۵). برای مثال سیال و همکاران^(۶) نشان دادند که در طی ۶۰ دقیقه فعالیت ورزشی زیربیشینه با شدت ۵۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی ($\text{VO}_{2\max}$)، میزان ظهور اسیدهای چرب آزاد در خون و هم‌چنین اکسیداسیون چربی در افراد سالمند نسبت به افراد جوان، کمتر و اکسیداسیون کربوهیدرات بیشتر است. هاگبرگ و همکاران^(۷) نشان دادند که مردان تمرین کرده جوان، میزان اکسیداسیون چربی و انرژی مصرفی بیشتری و غلظت اسیدهای چرب پلاسمای کمتری در پاسخ به ۶۰ دقیقه فعالیت ورزشی با شدت ۷۰ درصد $\text{VO}_{2\max}$ در مقایسه با مردان سالمند تمرین کرده دارند. واضح است که این موضوع به دلیل $\text{VO}_{2\max}$ بیشتر آزمودنی‌های تمرین کرده جوان در مقایسه با سالمند بوده است.

از طرفی نتایج نشان دادند که فعالیت بدنی منظم، از تغییرات متابولیسم مرتبط با افزایش سن جلوگیری می‌کند^(۳). مشخص شده است که تمرینات ورزشی می‌تواند اکسیداسیون چربی در عضله اسکلتی را در شرایط استراحت و فعالیت ورزشی افزایش دهد و درنتیجه باعث کاهش توده چربی بدن و چاقی شود که به تبع آن میزان بیماری‌های مرتبط با آن کاهش می‌یابد^(۱۱-۱۸). در یک تحقیق که افراد سالمند با افراد جوان مقایسه شده بودند، نقص در اکسیداسیون چربی در طی فعالیت ورزشی، بعد از ۱۶ هفتۀ تمرین استقامتی از بین رفت^(۸). فرارا و همکارانش^(۸) نشان دادند که در مقایسه با افراد جوان، اکسیداسیون چربی در استراحت به طور معنی‌داری در افراد سالمند غیرفعال پایین‌تر است، اما در افراد سالمند تمرین کرده تفاوتی مشاهده نکردند. درنهایت، تمرین استقامتی به عنوان یک محرك برای اکسیداسیون چربی در استراحت و فعالیت ورزشی در افراد سالمند پیشنهاد شده است^(۹).

کربوهیدرات و چربی دو منبع اصلی سوخت بدن در هنگام استراحت و فعالیت ورزشی هستند. دو عامل تعیین‌کننده مهم

4. Maximal Fat Oxidation

5. Fat Maximal (Fatmax)

6. Achten et al

7. Stisen et al

8. Nordby et al

1. Sial et al

2. Hagberg et al

3. Ferrara et al

با توجه به این که میزان $VO_{2\max}$ همراه با فعالیت‌های استقامتی افزایش می‌یابد و افراد سالمند تمایل بیشتری به انجام این نوع فعالیت‌های ورزشی دارند، در تیجه افراد سالمندی که فعالیت‌های استقامتی انعام می‌دادند، به عنوان آزمودنی در این تحقیق انتخاب شدند. تمام آزمودنی‌ها، پس از تکمیل پرسش نامه سلامت و فرم رضایت‌نامه، برای ارزیابی کامل سلامت، توسط پزشک معاینه شدند. از آزمودنی‌ها خواسته شد که رژیم غذایی معمولی خود را در روز قبل از آزمون رعایت و از تمرین و خوردن قهقهه اجتناب کنند. تمام آزمودنی‌ها در شروع اجرای پژوهش دچار هیچ‌گونه بیماری و عارضه‌ای نبودند و سیگار، الکل، مکمل یا داروی خاصی مصرف نمی‌کردند. قبل از دریافت فرم رضایت‌نامه، تمام مراحل اجرایی، خطرات و فواید این طرح پژوهشی به صورت شفاهی و کتبی برای آزمودنی‌ها توصیف شد. قبل از آزمون اصلی، طی یک جلسه، ترکیب بدن آزمودنی‌ها با استفاده از روش مقاومت بیوالکتریکی (شرکت این‌بادی²، مدل ۷۲۰، کشور کره جنوبی)، اندازه‌گیری شد. آزمودنی‌ها ساعت هشت تا ۱۰ صبح در حالت ناشتا (حداقل ۱۰ تا ۱۲ ساعت قبل) به آزمایشگاه مراجعه کردند، سپس آزمون فعالیت ورزشی فرایانده شامل؛ فعالیت با مراحل سه‌دقیقه‌ای را روی نوارگردان تا مرحله خستگی Fat_{max} و به منظور تعیین میزان اکسیداسیون سوبسترا، MFO و $VO_{2\max}$ انجام دادند. آزمون فعالیت ورزشی روی نوارگردان بر اساس روشی که ونبلر و همکارانش^۳ (۲۰۰۵) معرفی کردند، انجام شد.^۴ آزمودنی‌ها پس از پنج دقیقه گرم کردن، فعالیت خود را روی نوارگردان با سرعت سه و نیم کیلومتر در ساعت و با شیب یک درصد شروع کردند. سرعت دستگاه هر سه دقیقه، یک کیلومتر در ساعت افزایش یافت تا زمانی که سرعت به پنج و نیم کیلومتر در ساعت رسید. در این نقطه، سرعت ثابت و شیب دستگاه هر سه دقیقه به میزان دو درصد افزایش یافت تا زمانی که نسبت تبادل تنفسی^۴ (RER) برابر یک شود. پس از این مرحله سرعت دستگاه هر دقیقه یک کیلومتر در ساعت افزایش یافت تا فرد به خستگی کامل برسد، هدف از مرحله آخر، عدم رسیدن به $VO_{2\max}$ بود.^۵ معیارهای رسیدن به $VO_{2\max}$ افزایش اکسیژن مصرفی با افزایش شدت فعالیت، RER بالاتر از ۱/۰۵، ضربان قلبی معادل با ۱۰ ضربه کمتر از بیشینه ضربان

همکاران^۱ (۱۹) دریافتند. لذا این فرض شکل گرفت که فعالیت ورزشی منظم با افزایش ظرفیت اکسیداتیو از طریق افزایش تعداد و اندازه میتوکندری، افزایش آنزیم‌های درگیر در اکسیداسیون چربی و افزایش چگالی مویرگی می‌تواند از کاهش میزان اکسیداسیون چربی در افراد سالمند فعال جلوگیری کند. هم‌چنین در مطالعات پیشین که افراد نوجوان و جوان را مقایسه کرده بودند، مشخص شد که با افزایش سن و بلوغ میزان MFO و Fat_{max} کاهش می‌یابد، اما میزان MFO در افراد سالمند بررسی نشده است. این موضوع ممکن است به افراد سالمندی که می‌خواهند به منظور کاهش چربی بدن فعالیت ورزشی داشته باشند، کمک کند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، تعیین و مقایسه میزان اکسیداسیون سوبسترا، MFO و Fat_{max} در مردان سالمند فعال و غیرفعال می‌باشد.

روش‌شناسی

این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی است. ۱۰ مرد سالمند فعال (حداقل ۱۰ سال گذشته) که در هفته حداقل پنج ساعت فعالیت ورزشی منظم شامل دویدن یا دوچرخه‌سواری داشتند و ۱۰ مرد سالمند غیرفعال (حداقل ۱۰ سال گذشته) که فعالیت بدنی منظمی نداشتند، به صورت هدفمند غیرتصادفی به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. ویژگی‌های جسمی و فیزیولوژیکی آزمودنی‌ها در جدول یک ارائه شده است.

جدول ۱. ویژگی‌های جسمی و فیزیولوژیکی آزمودنی‌ها


متغیرها میانگین \pm انحراف معیار	فعال	سن (سال)
۵۹/۳ \pm ۶۰/۶۲	فعال	سی
۶۰/۴ \pm ۶/۱۳	غیرفعال	
۱۷۷/۷ \pm ۱۴/۳۵	فعال	قد
۱۶۹/۹ \pm ۵۰/۲۴	غیرفعال	(سانتی‌متر)
۶۸/۵ \pm ۳۱/۷۲	فعال	وزن
۷۷/۴ \pm ۶۸/۴۲	غیرفعال	(کیلوگرم)
۲۴/۱ \pm ۱۵/۹۱	فعال	شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترا مربع)
۲۸/۲ \pm ۵۳/۰۰	غیرفعال	
۱۷/۱ \pm ۱۱/۴۷	فعال	چربی بدن (درصد)
۲۴/۲ \pm ۱۸/۶۰	غیرفعال	
۴۴/۴ \pm ۶۴/۵۲	فعال	حداکثر اکسیژن مصرفی (میلی‌لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه)
۳۰/۳ \pm ۹۲/۲۵	غیرفعال	

2. Inbody


3. Venables et al

4. Respiratory Exchange Ratio

1. Lima et al



نمودار ۱- مقایسه MFO بین سالمندان فعال و غیرفعال



نمودار ۲- مقایسه Fatmax بین سالمندان فعال و غیرفعال

بحث نتیجه‌گیری

میزان $\text{VO}_{2\max}$ در سالمندان فعال و غیرفعال در این پژوهش به ترتیب 45 ± 4 و 44 ± 6 و $25 \pm 3 / 25 \pm 9$ (میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه) بود و مشخص شد که $\text{VO}_{2\max}$ به طور معنی‌داری در سالمندان فعال نسبت به غیرفعال بیشتر است. برخی تحقیقات نشان داده‌اند که $\text{VO}_{2\max}$ در مردان و زنان با توجه به سطح فعالیت بدنی تقریباً 10% به ازای هر دهه افزایش سن، کاهش می‌یابد^(۲۲). تمرینات منظم و شدید ممکن است که این کاهش در $\text{VO}_{2\max}$ را در افراد جوان و میان‌سال تا 50% کم کند، اما در افراد سالمند این گونه نمی‌باشد و افراد سالمند با تمرینات منظم فقط می‌توانند تا 10% از این کاهش $\text{VO}_{2\max}$ در هر دهه را کاهش دهند. اما در تحقیقات بسیاری مشخص شده است

قلب بود^(۱۳). در طول آزمون، حجم اکسیژن مصرفی و دی‌اکسید کربن دفعی به شیوه نفس به نفس با استفاده از دستگاه گاز آنالایزر (مدل کوارک پی اف تی^۱، شرکت کاسیدم^۲، کشور ایتالیا) اندازه‌گیری شد. میانگین اکسیژن مصرفی (VO_2) و دی‌اکسید کربن دفعی (VCO_2) در ۳۰ ثانیه پایانی هر مرحله از آزمون تعیین شد. میانگین مقادیر VO_2 در ۳۰ ثانیه پایانی هر مرحله از آزمون محاسبه و با تقسیم کردن آن بر مقدار $\text{VO}_{2\max}$ به عنوان شدت فعالیت در آن مرحله نشان داده شد و به صورت درصدی از $\text{VO}_{2\max}$ بیان شد. برای هر یک از مراحل سه دقیقه‌ای، میزان اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات با استفاده از معادلات عنصرسنجی^۳ جاکندرup و والیس^۴ (۲۰۰۵) محاسبه شد^(۲۱). بیشترین میزان اکسیداسیون چربی در بین شدت‌های مختلف، به عنوان MFO و شدتی که در آن حداکثر اکسیداسیون چربی رخ داد به عنوان Fat_{\max} در نظر گرفته شد.

از آزمون کالموگراف- اسمیرنف جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده‌ها استفاده شد. تفاوت‌های بین گروهی در میزان اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات، MFO و Fat_{\max} با استفاده از آزمون پارامتریک تی استوتدنت مستقل تعیین گردید. نتایج پژوهش در سطح $p \leq 0.05$ بود. نرم‌افزار SPSS (نسخه ۱۸) جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها


نتایج مقایسه میزان $\text{VO}_{2\max}$ بین سالمندان فعال و غیرفعال نشان داد که سالمندان فعال، به طور معنی‌داری $\text{VO}_{2\max}$ بالاتری نسبت به سالمندان غیرفعال داشتند ($p < 0.05$). هم‌چنین MFO در افراد سالمند فعال به طور معنی‌داری نسبت به افراد سالمند غیرفعال بالاتر بود ($p < 0.05$). در این پژوهش، Fat_{\max} در افراد سالمندی که فعالیت ورزشی منظم داشتند و فعال بودند، به طور معنی‌داری نسبت به سالمندان غیرفعال در شدت بالاتری رخ داد ($p < 0.05$). نمودار ۲. به علاوه میزان اکسیداسیون چربی در دامنه‌ای از شدت‌ها، به طور معنی‌داری در افراد سالمند فعال نسبت به غیرفعال نسبت به غیرفعال بالاتر بود ($p < 0.05$). در نهایت، میزان اکسیداسیون کربوهیدرات در دامنه‌ای از شدت‌ها، به طور معنی‌داری در افراد سالمند فعال نسبت به غیرفعال کمتر بود ($p < 0.05$). نمودار ۳. نمودار ۴).

1. Quark PFT
2. Cosmed
3. Etoichiometric Equations
4. Jeukendrup and Wallis

جدول ۲. مقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی بین سالمدانان فعال و غیرفعال


معنی‌داری	آماره‌های مرکزی		گروه‌ها	شاخص
	Sig	آمقدار		
. . / . ۱	. / . ۸		فعال	حداکثر اکسیژن مصرفی (میلی لیتر بر کیلو گرم در دقیقه)
			غیرفعال	

*تفاوت معنی‌دار با گروه سالمدان غیرفعال



*تفاوت معنی‌دار با گروه سالمدان فعال

نمودار ۳- مقایسه میزان اکسیداسیون چربی در دامنه‌ای از شدت‌ها بین سالمدانان فعال و غیرفعال



*تفاوت معنی‌دار با گروه سالمدان فعال

نمودار ۴_ مقایسه میزان اکسیداسیون کربوهیدرات در دامنه‌ای از شدت‌ها بین سالمدانان فعال و غیرفعال

همکاران^(۱۹)، خسروی و همکاران^(۲۸) تقریباً همسو است. از طرفی میزان MFO در افراد غیرفعال با گزارش‌های قبلی ارائه شده توسط محبی و همکاران^(۲۹,۳۰)، رامی و همکاران^(۳۱)، تقریباً همسو می‌باشد. اما این نکته قابل به ذکر است که آزمودنی‌های این تحقیقات افراد جوان غیرفعال، با و بدون اضافه‌وزن بوده‌اند و به دلیل این‌که میزان MFO در افراد سالماند تابه‌حال موربدبررسی قرار نگرفته بود، این مقایسه انجام شد. هم‌چنین میزان MFO در این پژوهش از مطالعات آچتن، جاکندروب و همکاران^(۳۲) کمتر بود. تفاوت‌های فردی از جمله سطح آمادگی و سن، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان MFO می‌باشند که می‌تواند تفاوت بین این مطالعه و مطالعات دیگر را توجیه کند^(۱۳,۱۹).

از دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود که Fat_{\max} در سالماندان فعال و غیرفعال به ترتیب در شدت‌های $۴۹/۷ \pm ۳/۸$ و $۳/۸ \pm ۳/۴$ درصد $\text{VO}_{2\max}$ رخ داد و مشخص شد که Fat_{\max} به طور معنی‌داری در سالماندان فعال نسبت به غیرفعال بیشتر است. یعنی شروع در کاهش اکسیداسیون چربی در افراد غیرفعال در شدت‌های پایین‌تر اتفاق می‌افتد و آزمودنی‌ها زودتر به مانع کربوهیدراتی وابسته می‌شوند. در مطالعه حاضر، میزان Fat_{\max} در افراد سالماند فعال نسبت به آزمودنی‌های جوان و میان‌سال فعال در مطالعات دیگر کمتر می‌باشد^(۱۲,۱۳,۱۶,۱۹,۳۲). هم‌چنین، میزان Fat_{\max} در افراد سالماند غیرفعال کمتر از افراد جوان و میان‌سال غیرفعال می‌باشد^(۲۰, ۲۹, ۳۰, ۳۳). به طور کلی در بازیبینی که آچتن و همکارانش^(۴) انجام دادند، گزارش شد که میزان Fat_{\max} در افراد تمرین‌کرده بین شدت ۵۹ تا ۶۴ درصد $\text{VO}_{2\max}$ و در افراد تمرین‌نکرده بین شدت ۴۷ تا ۵۲ درصد $\text{VO}_{2\max}$ رخ می‌دهد^(۳۴). نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش سن باعث کاهش میزان Fat_{\max} می‌شود و اگر فرد تمرین منظم نداشته باشد این کاهش بسیار زیاد خواهد بود، هم‌چنین مشخص شد که تمرینات منظم می‌تواند تاحدی از کاهش Fat_{\max} در افراد سالماند، جلوگیری کند. درواقع تحقیقات بسیاری نشان دادند که تمرین استقامتی می‌تواند به طور معنی‌داری اکسیداسیون چربی را در طی فعالیت ورزشی زیربیشینه افزایش دهد. داده‌هایی از مطالعات مقطعی و طولی از این نکته حمایت می‌کنند که تمرین اتکا به کربوهیدرات را به عنوان منبع انرژی

که افراد سالماند می‌توانند با انجام تمرینات منظم، همانند افراد جوان و میان‌سال سیستم قلبی تنفسی خود را بهبود ببخشند و $\text{VO}_{2\max}$ خود را افزایش دهند^(۲۲). افزایش توان هوایی ممکن است به دلیل افزایش حجم ضربه‌ای یا برداشت و جذب بیشتر اکسیژن خون توسط سلول‌ها، افزایش تعداد و حجم میتوکندری، توسعه شبکه مویرگی، افزایش غلظت هموگلوبین در خون و تغییرات ریوی باشد^(۲۲, ۲۳). بنابراین طبق اصل ویژگی تمرین انجام تمرینات هوایی موجب افزایش توان هوایی و بهبود عملکرد قلبی عروقی در تمام سین می‌شود. در این راستا، در مطالعه‌ای مشخص شد که میزان $\text{VO}_{2\max}$ افراد سالماند غیرفعال، بعد از ۶ ماه تمرین هوایی با شدت متوسط، به طور معنی‌داری بهبود یافت^(۲۳). هم‌چنین در تحقیق، کارول و همکارانش^(۲۴) مشخص شده است که افراد سالماند که تمرینات ورزشی منظم انجام می‌دهند، $\text{VO}_{2\max}$ بالاتر نسبت به افراد سالماند غیرفعال دارند. به طور کلی تحقیقات بسیاری بهبود استقامت قلبی عروقی را در افراد سالماند که تمرینات منظم هوایی انجام می‌دادند، نشان دادند^(۲۵). بنابراین نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته همسو بوده است و مشخص شد که افراد سالماند که فعالیت ورزشی منظم انجام می‌دهند، $\text{VO}_{2\max}$ بالاتر و درنتیجه آمادگی قلبی عروقی بهتری نسبت به افراد سالماند غیرفعال دارند.

میزان MFO در این پژوهش، در سالماندان فعال و غیرفعال به ترتیب $۰/۴۳ \pm ۰/۰۶$ و $۰/۲۹ \pm ۰/۰۴$ (گرم در دقیقه) بود و مشخص شد که MFO به طور معنی‌داری در سالماندان فعال نسبت به غیرفعال بیشتر است. تحقیقات پیشین نشان دادند، ظرفیت اکسیداسیون اسیدهای چرب در افرادی که از آمادگی هوایی بالایی برخوردارند، افزایش می‌یابد و وابستگی به متابولیسم کربوهیدرات کاهش می‌یابد^(۲۶). هم‌چنین فعالیت آنزیم‌های اکسیداتیو عضله افراد تمرین‌کرده نسبت به افراد بی‌تحرک بالاتر است^(۲۶, ۲۷). از طرف دیگر، افراد تمرین‌کرده استقامتی، درصد تارهای کندانقباض بیشتری نسبت به افراد تمرین‌نکرده دارند که این امر، ظرفیت اکسیداسیون هوایی را در آن‌ها بیشتر می‌کند. بنابراین علت اختلاف در مقادیر MFO در افراد فعال و غیرفعال احتماً درنتیجه تفاوت‌ها در میزان آمادگی اولیه افراد بوده است. میزان MFO در سالماندان فعال در این پژوهش با مطالعات آچتن و همکاران^(۱۶)، آدریانو و

2. Adriano et al
3. Jeukendrup

1. Carroll et al

گلیکولیتیک از انتقال اسید چرب با زنجیره طولانی به داخل میتوکندری جلوگیری می‌کند و بنابراین اکسیداسیون اسید چرب کاهش می‌یابد(۱۴,۳۷). در مطالعه حاضر، مقدار اکسیداسیون چربی روی نوارگردان از شدت ۲۰ تا تقریباً ۵۰٪ $VO_{2\max}$ در افراد فعال و ۲۰ تا تقریباً ۳۵٪ $VO_{2\max}$ در افراد غیرفعال، افزایش یافت و به مقدار بیشینه خود رسید، افزایش بیشتر درشدت فعالیت ورزشی با کاهش در اکسیداسیون چربی همراه بود.

درنهایت این پژوهش نشان داد که سالمدان فعال در مقایسه با سالمدان غیرفعال در تمام شدت‌های فعالیت ورزشی میزان اکسیداسیون کربوهیدرات کمتری داشتند. مطالعات نشان دادند که کاهش در اکسیداسیون چربی در حین فعالیت بدنی به یک افزایش جبرانی اکسیداسیون کربوهیدرات برای حفظ تولید انرژی، نیاز دارد(۳۸). در مطالعه حاضر، کمربودن اکسیداسیون چربی در افراد سالمدان غیرفعال با افزایش اکسیداسیون کربوهیدرات، همراه بود.

نتیجه‌گیری کلی از این پژوهش را می‌توان این‌گونه بیان کرد که افراد سالمندی که تمرينات ورزشی منظمی دارند، MFO، $VO_{2\max}$ و Fat_{max} بالاتری دارند و با این‌که همراه با افزایش سن میزان اکسیداسیون چربی، MFO و Fat_{max} کاهش می‌یابد، اما با تمرين ورزشی منظم می‌توان تا حدی از این کاهش جلوگیری کرد. به علاوه افراد سالمند فعال اگر باهدف کاهش وزن فعالیت می‌کنند، بهتر است با شدت تقریباً ۵۰٪ $VO_{2\max}$ تمرين کنند. هم‌چنین افراد سالمدان غیرفعال بهتر است برای کاهش درصد چربی بدن و بهبود کیفیت زندگی و کاهش بیماری‌های مزمن، تمرينات خود را با شدت تقریباً ۳۵٪ $VO_{2\max}$ شروع کنند و به تدریج شدت فعالیت خود را به ۵۰٪ $VO_{2\max}$ نزدیک کنند.

کاهش و درنتیجه اکسیداسیون چربی را در فعالیت زیربیشینه افزایش می‌دهد(۳۴). این افزایش در اکسیداسیون چربی در افراد سالمدان نیز مشاهده شده است(۹,۳۵). به نظر نمی‌رسد این افزایش اکسیداسیون چربی ناشی از تمرين استقاماتی، به دلیل افزایش لیپولیز کل بدن یا بخشی از بدن باشد و درنتیجه میزان در دسترس بودن اسیدهای چربی آزاد به عنوان یک دلیل برای افزایش اکسیداسیون چربی در نظر گرفته نمی‌شود. از طرفی شواهد نشان می‌دهند که بیان ژن و مقدار پروتئین انتقال‌دهنده‌های اسیدچرب در غشاء مایوسیت‌ها (FABP) (FAT/CD36) افزایش می‌یابد. مهم‌ترین سازگاری که در بدن در طی تمرين استقاماتی رخ می‌دهد، افزایش فعالیت آنزیم کارنیتین پالمیتول ترانسفراز-۱ (CPT-1) می‌باشد که به عنوان آنزیم محدودکننده میزان اکسیداسیون چربی شناسایی شده است(۳۴).

همچنین در این پژوهش مشخص شد که سالمدان فعال در مقایسه با سالمدان غیرفعال در تمام شدت‌های فعالیت ورزشی میزان اکسیداسیون چربی بیشتری داشتند. زیرا همان‌طور که اشاره شد، افراد تمرين کرده نسبت به افراد تمرين نکرده به دلیل سازگاری‌های فیزیولوژیکی، توانایی بالاتری در میزان اکسیداسیون چربی دارند. شدت فعالیت ورزشی همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات شناخته شده است. تغییر جهت در استفاده از سوبسترا با افزایش شدت صورت می‌گیرد(۱۲,۱۴,۲۰,۳۲,۳۶). این موضوع نیز در پژوهش حاضر مشاهده شد. هنگامی که شدت تمرين از کم تا متوسط افزایش می‌یابد، سرعت لیپولیز، مقدار جریان خون بافت چربی و جریان خون عضله افزایش می‌یابد که باعث افزایش دسترسی عضلات به اسید چرب می‌شود. زمانی که شدت به مقدار بسیار زیاد افزایش می‌یابد، اکسیداسیون کربوهیدرات به طور برجسته‌ای افزایش خواهد یافت(۱۴). زیرا افزایش در چرخه

منابع

- Short KR, Vittone JL, Bigelow ML, Proctor DN, Rizza RA, Coenen-Schimke JM, et al. Impact of aerobic exercise training on age-related changes in insulin sensitivity and muscle oxidative capacity. *Diabetes*. 2003; 52(8):1888-96.
- R Risinga PAT, S Snitkera & E Ravussina. Decreased ratio of fat to carbohydrate oxidation with increasing age in Pima Indians. *J Am Coll Nutr*. 1996; 15(3): 309-12.
- MORIO BFjea. Muscle fatty acid oxidative capacity is a determinant of whole body fat oxidation in elderly people. *Am J Physiol Endocrinol Metab*. 2001; 6(280): 143-9.
- Calles-Escandon J, Arciero PJ, Gardner AW, Bauman C, Poehlman ET. Basal fat oxidation decreases with aging in women. *J Appl Physiol*. 1995; 78(1): 266-71.
- Bassami M, Ahmadizad S, Doran D, MacLaren DP. Effects of exercise intensity and duration on fat metabolism in trained and untrained older males. *Eur J Appl Physiol*. 2007; 101(4): 525-32.

6. Sial S, Coggan AR, Carroll R, Goodwin J, Klein S. Fat and carbohydrate metabolism during exercise in elderly and young subjects. *Am J Physiol.* 1996; 271(6 Pt 1): E983-9.
7. Hagberg JM, Seals DR, Yerg JE, Gavin J, Gingerich R, Premachandra B, et al. Metabolic responses to exercise in young and older athletes and sedentary men. *J Appl Physiol.* 1988; 65(2):900-8.
8. Ferrara CM, Goldberg AP, Ortmeyer HK, Ryan AS. Effects of aerobic and resistive exercise training on glucose disposal and skeletal muscle metabolism in older men. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci.* 2006; 61(5):480-7.
9. Poehlman ET, Gardner AW, Arciero PJ, Goran MI, Calles-Escandon J. Effects of endurance training on total fat oxidation in elderly persons. *J Appl Physiol.* 1994; 76(6):2281-7.
10. Pruchnic R, Katsiaras A, He J, Kelley DE, Winters C, Goodpaster BH. Exercise training increases intramyocellular lipid and oxidative capacity in older adults. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 2004; 287(5):E857-62.
11. Solomon TP, Sistrun SN, Krishnan RK, Del Aguila LF, Marchetti CM, O'Carroll SM, et al. Exercise and diet enhance fat oxidation and reduce insulin resistance in older obese adults. *J Appl Physiol.* 2008; 104(5):1313-9.
12. Achten J, Gleeson M, Jeukendrup AE. Determination of the exercise intensity that elicits maximal fat oxidation. *Med Sci Sports Exerc.* 2002; 34(1): 92-7.
13. Achten J, Jeukendrup AE. Maximal fat oxidation during exercise in trained men. *Int J Sports Med.* 2003; 24(8):603-8.
14. Romijn JA, Coyle EF, Sidossis LS, Gastaldelli A, Horowitz JF, Endert E, et al. Regulation of endogenous fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity and duration. *Am J Physiol.* 1993; 265(3 Pt 1): E380-91.
15. Klein S, Coyle EF, Wolfe RR. Fat metabolism during low-intensity exercise in endurance-trained and untrained men. *Am J Physiol.* 1994; 267(6 Pt 1): E934-40.
16. Achten J, Jeukendrup AE. The effect of pre-exercise carbohydrate feedings on the intensity that elicits maximal fat oxidation. *J Sports Sci.* 2003; 21(12): 1017-24.
17. Stisen AB, Stougaard O, Langfort J, Helge JW, Sahlin K, Madsen K. Maximal fat oxidation rates in endurance trained and untrained women. *Eur J Appl Physiol.* 2006; 98(5):497-506.
18. Nordby P, Saltin B, Helge JW. Whole-body fat oxidation determined by graded exercise and indirect calorimetry: a role for muscle oxidative capacity? *Scand J Med Sci Sports.* 2006; 16(3): 209-14.
19. Lima-Silva AE, Bertuzzi RC, Pires FO, Gagliardi JF, Barros RV, Hammond J, et al. Relationship between training status and maximal fat oxidation rate. *J Sports Sci Med.* 2010; 9(1):31-5.
20. Venables MC, Achten J, Jeukendrup AE. Determinants of fat oxidation during exercise in healthy men and women: a cross-sectional study. *J Appl Physiol.* 2005; 98(1):160-7.
21. Jeukendrup AE, Wallis GA. Measurement of substrate oxidation during exercise by means of gas exchange measurements. *Int J Sports Med.* 2005; 26 Suppl 1:S28-37.
22. Hawkins S, Wiswell R. Rate and mechanism of maximal oxygen consumption decline with aging: implications for exercise training. *Sports Med.* 2003; 33(12):877-88.
23. Strasser B, Keinrad M, Haber P, Schobersberger W. Efficacy of systematic endurance and resistance training on muscle strength and endurance performance in elderly adults- a randomized controlled trial. *Wien Klin Wochenschr.* 2009; 121(23-24):757-64.
24. Carroll JF, Convertino VA, Pollock ML, Graves JE, Lowenthal DT. Effect of 6 months of exercise training on cardiovascular responses to head-up tilt in the elderly. *Clin Physiol.* 1995; 15(1): 13-25.
25. Bouaziz W, Schmitt E, Kaltenbach G, Geny B, Vogel T. Health benefits of endurance training alone or combined with diet for obese patients over 60: a review. *Int J Clin Pract.* 2015; 69(10): 1032-49.
26. Maclarens D, Morton J. Biochemistry for Sport and Exercise Metabolism: John Wiley & Sons, Azar 14, 1390 AP - Science - 264 pages.
27. Jeukendrup AE. Modulation of carbohydrate and fat utilization by diet, exercise and environment. *Biochem Soc Trans.* 2003; 31(Pt 6):1270-3.
28. Khosravi N, Souris R, Shahgholian S. The Effect of Time of Day on Fat Oxidation Indexes (MFO, Fat max, MFO time) in Healthy Young Women. *Sport Biosciences.* 2012(11):75-88. (Persian).
29. Mohebbi H, Azizi M. Maximal fat oxidation at the different exercise intensity in obese and normal weight men in the morning and evening. *J of Human Sport & Exercise.* 2011; (6): 49-58.
30. Mohebbi H, Azizi M, Tabari E. Effect of time of day on MFO and FATmax during exercise in obese and normal weight women. *Physical Education and Sport.* 2011; 9(1):69-79.
31. Rami M, Habibi A, Shakerian S. Maximal Fat Oxidation during exercise in trained Male students. *Int J of Sport Studies.* 2012; 2(7): 334-9.
32. Achten J, Venables MC, Jeukendrup AE. Fat oxidation rates are higher during running compared with cycling over a wide range of intensities. *Metabolism: Clinical and Experimental.* 2003; 52(6):747-52.
33. Rohani H, Safari musavi SS, Golamian S, Farzaneh E. Comparison of maximal fat oxidation and Fatmax in trained and untrained women. *Exercise Physiology.* 2015; 7(28): 31-44.(Persian).
34. Achten J, Jeukendrup AE. Optimizing fat oxidation through exercise and diet. *Nutrition.* 2004; 20(7-8):716-27.
35. Sial S, Coggan AR, Hickner RC, Klein S. Training-induced alterations in fat and carbohydrate metabolism during exercise in elderly subjects. *Am J Physiol.* 1998; 274(5 Pt 1): E785-90.
36. Sidossis LS, Gastaldelli A, Klein S, Wolfe RR. Regulation of plasma fatty acid oxidation during low- and high-intensity exercise. *Am J Physiol.* 1997; 272(6 Pt 1): E1065-70.
37. Phillips SM, Green HJ, Tarnopolsky MA, Heigenhauser GF, Hill RE, Grant SM. Effects of training duration on substrate turnover and oxidation during exercise. *J Appl Physiol.* 1996; 81(5):2182-91.
38. Horowitz JF, Mora-Rodriguez R, Byerley LO, Coyle EF. Lipolytic suppression following carbohydrate ingestion limits fat oxidation during exercise. *Am J Physiol.* 1997; 273(4 Pt 1):E768-75.

Comparison of maximal fat oxidation and Fat_{\max} between active and inactive elderly men

Mehrdad Fathi^{1*}, Behnam Rozbeh², Mahdi Seyfi rezvani³

1. Associate professor of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2. Ph.D., Exercise Biochemistry and Metabolism, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3. M.S, Exercise physiology, Payame Noor University of Mashhad, Mashhad, Iran

Received: 2018/9/3

Revised: 2018/12/26

Accepted: 2019/3/17

*Correspondence
Email:

Mfathei@um.ac.ir

Abstract

Introduction: The aim of this study was to compare maximal fat oxidation and the exercise intensity that elicit maximal fat oxidation (Fat_{\max}) between active and inactive elderly men.

Methods: 10 healthy elderly men that had regular exercise (at least 10 past years, $\text{VO}_{2\max} 44.64 \pm 4.52 \text{ ml.kg.min}$) and 10 healthy elderly men that hadn't any regular exercise (at least 10 past years, $\text{VO}_{2\max} 30.92 \pm 3.25 \text{ ml.kg.min}$), were selected as the subjects of this study. Then, the participants performed an incremental exercise test at 8 to 10 am in the fasting state, including activity with 3 minutes stages on a treadmill to exhaustion. The amount of maximal fat oxidation and Fat_{\max} were measured through the indirect calorimetry method using the gas analysis system with the aim of the stoichiometric equation. To compare the variables, the independent t-test ($p > 0.05$) was used.

Results: Fat oxidation rate in the range of intensities, maximal fat oxidation and Fat_{\max} in active elderly men was significantly higher than inactive elderly men ($p < 0.05$). But, the Carbohydrate oxidation rate in the range of intensities was significantly lower in the active compared to inactive elderly ($p < 0.05$).

Conclusion: In general, it was found that a better state of fitness in active elderly associated with higher fat oxidation and lower carbohydrate oxidation in the range of intensities. Moreover the amount of maximal fat oxidation and Fat_{\max} decrease in the elderly, but this decrease can partly be prevented with regular exercise.

Key Words: Maximal fat oxidation, Fat_{\max} , State of fitness, Elderly men.